

Тести із незаразної патології

Тестове завдання із незаразної патології.

(ветеринарне акушерство, гінекологія і біотехнологія розведення сільськогосподарських тварин)

1. Вкажіть, які акушерські захворювання можуть призводити до розвитку даної патології?

1. Ендометрит
2. Затримання посліду
3. Післяродова буйність
4. Субінволюція матки
5. Післяродове залежування
6. Родильний парез
7. Родові травми
8. Неправильне членорозміщення плода

2. Які порушення технології утримання і годівлі тварин сприяють виникненню даного захворювання?

1. Відсутність родильного відділення
2. Несвоєчасне осіменіння тварин
3. Відсутність активного моціону
4. Неповноцінна і недостатня годівля тварин
5. Несвоєчасний запуск вагітних тварин
6. Тривалий сухостійний період більше 60 днів
7. Короткий сухостійний період менше 45 днів

8. Напування корів із природного водойому

3. Чим обумовлений економічний збиток при даному захворюванні?

1. Недоодержанням гною

2. Перевитратою електроенергії на охолодження молока

3. Недоодержанням телят і молока

4. Затратами на лікування телят

5. Затратами на лікування хворих корів

6. Затратами на лікування тварин із даною патологією

7. Зниженням якості молока

8. Зниженням якості яловичини

4. Вкажіть, який стан яєчників при даній патології?

1. Нормальний

2. Гіпофункція

3. Персистентне жовте тіло

4. Циклічне жовте тіло

5. Жовте тіло вагітності

6. Кіста яєчника

7. Атрофія яєчника

5. Які клінічні ознаки спостерігаються при даному захворюванні?

1. Відсутність жуйки

2. Підвищення температури тіла

3. Анафродизія

4. порушення ритмів статевої циклічності
5. Слабке скорочення матки при ректальному дослідженні
6. Виділення гнійно-катарального ексудату із статевих органів
7. набряк і гіперемія вульви

6. Які клінічні ознаки характерні для даного захворювання при ректальному дослідженні?

1. Висока ригідність матки
2. Ослаблені скорочення матки
3. Флуктуація
4. Потовщення стінки матки
5. Болючість матки
6. Потовщення шийки матки
7. Збільшення довжини рогів матки
8. Виділення лохій

7. Від яких захворювань необхідно віддеференціювати дану патологію?

1. Субінволюція матки
2. Атонія, гіпотонія передшлунків
3. Ендометрит
4. Піометра
5. Сальпінгіт
6. Цервіцит
7. Оофорит

8. Параметрит

8. Вкажіть, який прогноз ставиться при даному захворюванні щодо життя тварини і відтворної функції?

1. Сприятливий
2. Обережний
3. Сприятливий. Обережний
4. Несприятливий. Сприятливий
5. Обережний. Несприятливий
6. Несприятливий. Обережний
7. Несприятливий
8. Обережний. Сприятливий

9. Вкажіть можливі варіанти лікування хворих тварин

1. Лютеолізуючі препарати
2. Міотропні
3. Антибактеріальні
4. Гормональні
5. Простагландини

10. Які препарати належать до міотропних?

1. Естрофан
2. Окситоцин, пітуїтрин
3. Сінестрол
4. Прогестерон
5. Сурфагон

11. Вкажіть препарати, що володіють лютеолітичною дією

1. Простагландини групи E
2. Прогестерон
3. Сінестрол
4. Простагландини групи F2α

12. Вкажіть наслідки осіменіння тварин при даній патології порівняно із здоровими тваринами

1. Всі тварини запліднюються
2. Значно знижується заплідненість
3. Всі тварини залишаються неплідними
4. Підвищується запліднювальність
4. Запліднювальність не змінюється

1. Які генітальні і екстрагенітальні порушення передують розвитку даного захворювання?

1. Затримання посліду
2. Патологічні роди
3. Травми родових шляхів
4. Порушення обміну речовин
5. Патологія печінки
6. Ожиріння сухостійних тварин
7. Низька молочна продуктивність
8. Тривалий сухостійний період

2. Вкажіть зовнішні фактори, що сприяють виникненню

захворювання у корів?

1. Висока мікробна забрудненість родильного відділення
2. Недостатня освітленість родильного відділення
3. Низька температура повітря у родильному відділенні
4. Відсутність профілакторію для телят
5. Годівля корів сіном в волю
6. Перебої у водопостачанні родильного відділення
7. Наявність двох родильних відділень у господарстві
8. Часта дезінфекція у родильному відділенні

3. Який економічний збиток наносить дане захворювання?

1. Знижується молочна продуктивність
2. Зменшується тривалість сухостійного періоду
3. Зменшується міжотельний інтервал
4. Збільшується тривалість неплідності у корів
5. Збільшуються затрати кормів на одиницю продукції
6. Знижується вгодованість тварин
7. Підвищується апетит у корів
8. Зменшується кількість гною на фермі

4. Самки яких видів свійських і домашніх тварин хворіють частіше?

1. Суки
2. Кішки
3. Кобили

4. Вівці

5. Кози

6. Корови

7. Кролиці

5. Якими шляхами мікрофлора може проникнути в матку?

1. Через шлунково-кишковий тракт

2. Через органи дихання

3. Гематологічним

4. Через відкритий канал шийки матки

5. Через шкіру

6. Лімфогенним

6. Які дії лікаря ветеринарної медицини сприяють розвитку захворювання?

1. Порушення ветеринарно-санітарних правил надання рододопомоги

2. Порушення розпорядку дня

3. Несвоєчасна діагностика вагітності

7. Які клінічні ознаки найбільш характерні при даному захворюванні?

1. Пригнічення тварин

2. Втрата апетиту

3. Відсутність жуйки

4. Виділення гнійно-катарального ексудату із статевих органів під час лежання тварини або масажу

5. Засохлі кірочки гною на внутрішній поверхні кореня хвоста, сідничних горбах
6. Виділення прозорого слизу із статевої щілини
7. Кровотеча із статевих органів
8. Тварина збуджена
8. Найбільш характерні клінічні ознаки при вагінальному дослідженні
 1. Привідкритий канал шийки матки та виділення слизу із нього
 2. Гіперемія каудальної частини шийки матки
 3. Слизова пробка у каналі шийки матки
 4. Закритий канал шийки матки
9. Найбільш характерні клінічні ознаки при ректальному дослідженні
 1. Зменшення величини рогів матки
 2. Гіпотонія матки
 3. Збільшення об'єму рогів матки
 4. Потовщення стінки матки
 5. Незначна флюктуація в рогах матки
 6. Крепітація рогів матки
 7. Виділення слизу під час дослідження
 8. Виділення гнійно-катарального ексудату
10. Вкажіть який характер запального процесу у хворої тварини
 1. Фібринозний

2. Гангренозний

3. Некротичний

4. Гнійно-катаральний

11. Вкажіть, який прогноз щодо життя хворої тварини і її відтворної здатності

1. Сприятливий

2. Обережний

3. Несприятливий

12. Які лабораторні дослідження необхідно провести для правильного лікування?

1. Бактеріологічне дослідження вмістимого матки і визначення чутливості мікрофлори до антимікробних препаратів

2. Гематологічне дослідження

3. Патологоанатомічне дослідження зразків слизової оболонки матки

4. Біохімічне дослідження крові

13 Вкажіть, які види терапії використаєте при лікуванні хворих тварин

1. Етіотропна

2. Патогенетична

3. Фізіотерапія

4. Симптоматична

14. Вкажіть, які профілактичні заходи проводяться при даному захворюванні у сухостійний період

1. Зменшеннякормів у раціоні

2. Вітамінізація тварин
3. Організація цеху сухостою
4. Організація активного моціону
5. Введення антиоксидантів
6. Вакцинація корів проти паратифу або колібактеріозу
7. Обмеження водопою
8. Збільшення дачі грубих кормів

1. Вкажіть, які порушення технології утримання і годівлі тварин сприяють виникненню даного ускладнення?

1. Несвоєчасне осіменіння тварин
2. Осіменіння тварин до досягнення ними фізіологічної зрілості
3. Відсутність активного моціону
4. Надмірна годівля вагітних тварин
5. Неповноцінна годівля
6. Відсутність родильного відділення
7. Несвоєчасний запуск тварин (укорочений сухостійний період)
8. Осіменіння корів дрібних порід спермою бугаїв від великих порід

2. Які дії ветлікаря в даній ситуації?

1. Залишити тварину в спокої
2. Провести тракцію плода шляхом кантування
3. Провести операцію кесарів розтин
4. Відправити тварину на забій

5. Провести фетотомію
6. Надавати рододопомогу силою 2–4 людей
7. Надавати рододопомогу із застосуванням....

3. Клінічні ознаки даного ускладнення

1. Не відходять навколоплідні води
2. В родовому каналі знаходять передлежачі частини тіла плода
3. Плід не рухається по родових шляхах
4. Розміри плода не відповідають розмірам тазу
5. Не проявляються перейми і потуги
6. Проявляються бурхливі перейми і потуги
7. Знижується апетит
8. Виділяється молозиво із молочної залози

5. Які клінічні ознаки спостерігаються при даному захворюванні?

1. Відсутність жуйки
2. Підвищення температури тіла
3. Анафродизія
4. Порушення ритмів статевої циклічності
5. Слабке скорочення матки при ректальному дослідженні
6. Виділення гнійно-катарального ексудату із статевих органів
7. набряк і гіперемія вульви

6. Які клінічні ознаки характерні для даного захворювання при ректальному дослідженні?

1. Висока ригідність матки
2. Ослаблені скорочення матки
3. Флюктуація
4. Потовщення стінки матки
5. Болючість матки
6. Потовщення шийки матки
7. Збільшення довжини рогів матки
8. Виділення лохій

7. Від яких захворювань необхідно віддеференціювати дану патологію?

1. Субінволюція матки
2. Атонія, гіпотонія передшлунків
3. Ендометрит
4. Піометра
5. Сальпінгіт
6. Цервіцит
7. Оофорит
8. Параметрит

8. Вкажіть, який прогноз ставиться при даному захворюванні щодо життя тварини і відтворної функції?

1. Сприятливий
2. Обережний
3. Сприятливий. Обережний

4. Неприятливий. Сприятливий

5. Обережний. Неприятливий

6. Неприятливий. Обережний

7. Неприятливий

8. Обережний. Сприятливий

9. Вкажіть можливі варіанти лікування хворих тварин

1. Лютеолізуючі препарати

2. Міотропні

3. Антибактеріальні

4. Гормональні

5. Простагландини

10. Які препарати належать до міотропних?

1. Естрофан

2. Окситоцин, пітуїтрин

3. Сінестрол

4. Прогестерон

5. Сурфагон

11. Вкажіть препарати, що володіють лютеолітичною дією

1. Простагландини групи E

2. Прогестерон

3. Сінестрол

4. Простагландини групи F2 α

12. Вкажіть наслідки осіменіння тварин при даній патології порівняно із здоровими тваринами

1. Всі тварини запліднюються
2. Значно знижується заплідненість
3. Всі тварини залишаються неплідними
4. Підвищується запліднювальність
4. Запліднювальність не змінюється