

Тестове завдання Оперативна хірургія

1

Розшарування тканин проводять

Ручкою скальпеля

Тампоном та пальцями

Браншами ножиць

(ВІРНА) всіма перерахованими методами

2

Для віддавлення деяких органів використовують

(ВІРНА) емаскулятори, екзатери

Ножиці

Зажими Кохера

Пінцети

3

Остеотомія це

розміщення кісткової тканини

(ВІРНА) роз'єднання кістки

Розплавлення кістки

Роз'єднання м'язів

4

Трепанація це –

Розріз шкіри лобової пазухи

(ВІРНА) утворення отвору в кістці

Повздовжній розріз кістки

Повторний перелом кістки

5

Резекція це –

Розріз кістки

Утворення отвору в кістці

(ВІРНА) вирізання частини кістки

Розміщення кістки

6

Клінок скальпеля має:

(ВІРНА) кінчик, лезо, спинку

Спинку та черевце

Черевце, кінчик, лезо

Спинку, черевце, шийку

7

Ранові зонди використовуються

Для дренування ранового каналу

(ВІРНА) для дослідження ранового каналу, фістул, карманів

Для виймання сторонніх предметів з ранового каналу

Для введення лікарських речовин в рановий канал, кармани та інші порожнини.

8

Распатори використовують для:

Утворення отвору в кістці

Розрізу кістки

(ВІРНА) відокремлення окістя

Розміщення кістки

9

Леватори використовують для:

Розміщення кістки

Утворення отвору в кістці

(ВІРНА) підтримання кісток

Віддавлення деяких органів

10

Після чого настає паралітична кровотеча

(ВІРНА) після тривалого накладання джута

Після введення наркотичних речовин

Після застосування гемолітичних засобів

Після місцевого знеболення

11

Арозійна кровотеча виникає:

Після розриву великих судин

Після розриву паранхіматозного органу

(ВІРНА) при розпаді стінки судини в патологічному вогнищі

На місці ссадин

12

Джут для зупинки кровотечі накладають в теплу пору року на

20-30 хв

2-3 години

(ВІРНА) 1-2 години

40-50 хв

13

Взимку джут для зупинки кровотечі накладають на:

10-15 хв

2-3 години

30-40 хв

(ВІРНА) 1 годину

14

Який з препаратів не використовують для профілактики кровотечі

Вікасол

Кальцію хлорид

(ВІРНА) гепарин

Сумісну кров

15

Який з перапаратів використовують для профілактики кровотечі

(ВІРНА) сироватку

0,9% натрію хлорид

Глюкозу

Папаверину гідрохлорид

16

Торзування судин це –

(ВІРНА) скручування

Розривання

Здавлювання

Зшивання

17

Ангіотрипсія це –

(ВІРНА) роздавлення судин

Розривання судин

Зшивання судин

Скручування судин

18

Для зупинки кровотечі в суглобу порожнину найбільш доцільним є:

(ВІРНА) використання холоду

Лігування судин

Накладання тиснучої пов'язки

Тампонада

19

Для зупинки кровотечі використовують:

(ВІРНА) 3% розчин пероксиду водню

0,9% натрію хлорид

2% розчин новокаїну

Розчин фурациліну

20

Гемостатична губка відноситься до:

Хімічного способу зупинки кровотечі

(ВІРНА) біологічного способу зупинки кровотечі

Механічного способу зупинки кровотечі

Термічного способу зупинки кровотечі

21

Накладання швів протипоказано:

При рваних ранах

(ВІРНА) при наявності в рані септичного процесу

При ранах в ділянці кінцівок

При розриві тільки шкіри

22

Який з кровозупинних засобів може призвести до виникнення вторинної

кровотечі:

Амінокапронова кислота

Адреналін

Вікасол

Ерготал

23

Ситуаційний шов накладають

Коли не знають точно часу утворення рани

Коли рана має незначний просвіт

Коли в рані відбувається септичний процес

(ВІРНА) при довгих ранах із складаною конфігурацією.

24

При ушиванні рани місце вколу голки знаходиться на відстані від країв рани:

2-3 мм

(ВІРНА) 5-10 мм

1,5-2 см

Не має значення

25

Хірургічний вузол відрізняється від морського тим, що :

Другий не використовують для з'єднання ран

(ВІРНА) в хірургічному вузлі в першому вузлі нитку перекручують 2 рази, а в морському 1.

Перший використовують на післяопераційних ранах, а другий на рваних

Мають тільки різну наву

26

Особливістю заглибного шва є:

Його роблять тільки безперервним

(ВІРНА) вузли не зміщують в бік

Його роблять тільки розсмоктуючимся шовним матеріалом

края рани зближують не повністю

27

Шов Ламбера це –

Безперервний шов на фасції

(ВІРНА) 2-й поверх кишкового шва

1-й поверх кишкового шва

Сечоміхуровий шов

28

Шов Шмідена це:

(ВІРНА) 1-й поверх кишкового шва

1-й поверх шва на сечовий міхур

2-й поверх кишкового шва

Вузлуватий кишковий шов

29

Кишкові шви накладають:

Трикутними голками

Прямими голками

(ВІРНА) круглими голками

Півкруглими

30

При зшиванні сечового міхура не рекомендується:

накладати двоповерховий шов

робити його кетгутом

(ВІРНА) проколювати слизову оболонку

Використовувати круглі голки

31

Зовнішні шви не можна накладати

(ВІРНА) кетгутом

Шовком

Капроною ниткою

Лескою

32

Звичайно шви з шкіри знімають через:

5-6 дні

(ВІРНА) 8-10 днів

12-15 днів

15-18 днів

33

Консервативне лікування закритих переломів передбачає

використання знеболюючих та протизапальних мазей

(ВІРНА) іммобілізацією кінцівки шиною або гіпсовою пов'язкою

Процес загоєння іде без будь-якого втручання лікаря

Виконання остеосинтезу

34

Тривалість накладання гіпса або шини

10-14 днів

15-25 днів

(ВІРНА) 25-35 днів

35-45 днів

35

Остеосинтез це –

Консервативне з'єднання кісток з наступною їх фіксацією шиною

Нарощування кістки на місці перелому

(ВІРНА) з'єднання кісток кривавим способом

Пересадка в місце перелому частки кістки з іншого місця.

36

При закритих переломах остеосинтез проводять:

Через 1 тиждень після травми

Через 5-6 годин після травми

(ВІРНА) через 1 добу після травми

Не має значення коли

37

Не можна використовувати цеакрінкрилатне з'єднання:

При операціях на органах шлунково-кишкового тракту

При цистотомії і уретротомії

(ВІРНА) при значній кількості жирової тканини

При купіюванні вушних раковин у собак

38

Інтрамедулярний остеосинтез це з'єднання кісток:

За допомогою пластин

(ВІРНА) за допомогою штифта

За допомогою гіпса

За допомогою дротяних лігатур

39

Кістково-накладний остеосинтез це з'єднання кісток за допомогою

Допоміжної кістки з наступним її прикручуванням

(ВІРНА) пластини

Штифта

Накладання гіпса

40

Металеві штифти видаляють через:

(ВІРНА) 4-5 тижнів

10-14 днів

1,5-2 місяці

2-3 тижні

41

Хірургічна голка 4В1 – це голка:

Півкругла колюча

Зігнута ріжуча

Пряма колюча

(ВІРНА) півкругла ріжуча

42

Штифти можуть бути

Тільки циліндричні

Тільки чотиригранні

Тільки пластинчасті

(ВІРНА) всі перераховані

43

Який з препаратів судинозвужуючу та підвищуючу зсідання крові дію:

Адреналін

Вікасол

(ВІРНА) Іхтіол

Амінокапронова кислота

44

При переломі дистальної ділянки кістки штифт повинен бути введений

(ВІРНА) до упору в дистальний епіфіз кістки, інколи пройти через суглоб

В периферичний уламок на 5-6 см

До упору в проксимальний епіфіз кістки

На всю довжину дистального уламка

45

Інтрамедулярний остеосинтез проводять під

Комбінованим наркозом

(ВІРНА) поєднаним наркозом

Нейролепаналгезією

Місцевою анестезією

46

Остеосинтез стегнової кістки штифтом великим собакам проводять через:

3 розрізи

1 розріз

(ВІРНА) 2 розрізи

4 розрізи

47

Остеосинтез стегнової кістки штифтом дрібним собакам проводять через:

3 розрізи

(ВІРНА) 1 розріз

2 розрізи

5 розрізів

48

При переломі плечової кістки у собак виконують доступ:

3 медіального боку

(ВІРНА) з латерального боку

3 дорсального боку

3 медіального або латерального боку

49

Провізорні – це шви:

Заглибні

Постійні

(ВІРНА) тимчасові

З"єднуючі

50

При накладному остеосинтезі знімають пластину через

3-4 тижні

(ВІРНА) 5-6 тижнів

16-17 днів

1 тиждень

51

При анаеробній інфекції м"язи:

Розрізають повздовжньо

(ВІРНА) розрізають поперек

Роз"єднують тупим способом

Не роз"єднують

52

При вадах шкіри виконують розрізи:

Клаптеві

Прямолінійні

(ВІРНА) веретеноподібні

Півкруглі

53

Для вискрібання стінок норицевих каналів використовують:

Распатори

Екразери

(ВІРНА) кюретки

Трефіни

54

Для відшарування окістя від поверхні кістки використовують:

(ВІРНА) распатори

Екразери

Кюретки

Трефіни

55

Шов Ламбера накладають, прошиваючи :

Серозну оболонку

(ВІРНА) серозну і м'язові оболонки

Слизову оболонку

Всю товщу органу

56

Шов Плахотіна – Садовського накладають прошиваючи:

Серозну оболонку

(ВІРНА) серозну і м'язові оболонки

Слизову оболонку

Всю товщу органу

57

Пов'язки бувають

Косинкові, спідничкові, бинтові

Бинтові, пращоподібні, пояскові

(ВІРНА) косинкові, пращоподібні, бинтові

Косинкові, платочкові, пояскові

58

Розміри косинкової пов'язки зазвичай

(ВІРНА) 30-50х15-25 см

10-15х10-15 см

70-90х80-100 см

5-10х1-3 см

59

Бинтові пов'язки бувають

(ВІРНА) циркулярні, спиралеподібні, восьмиподібні, повзучі

Циркулярні, восьмиподібні, повзучі, клейові

Циркулярні, лігатурні, восьмиподібні, клейові

Спиралеподібні, циркулярні, восьмиподібні

60

Початок та кінець пов'язки розміщують

Безпосередньо на місці пошкодження

збоку від місця пошкодження

(ВІРНА) на боці протилежному місцю пошкодження

Не має значення

61

Пов'язка у вигляді декількох кругових турів бинту, які повиністю покривають один одного це –

Спіралеподібна пов'язка

Пращеподібна пов'язка

(ВІРНА) циркулярна пов'язка

Лігатурна пов'язка

62

Пов'язка починається 2-3 турами кожен наступний тур ведуть косо догори покриваючи на 1/3

Попередній це –

Восьмиподібно пов'язка

Циркулярна пов'язка

Повзуча пов'язка

(ВІРНА) спіралеподібна пов'язка

63

Спиральну пов'язку з перегинами накладають на

(ВІРНА) ділянки тіла які мають конусоподібну форму

На шию

На тулуб

На суглоби

64

Пов'язка накладається гвиндоподібно знизу до гори, кожен наступний оберт

відстоїть від попереднього на ширину бинта – це:-

Спиралеподібна пов'язка

Восьмиподібна пов'язка

(ВІРНА) повзуча пов'язка

Циркулярна пов'язка

65

Восьмиподібну пов'язку накладають

(ВІРНА) в ділянці суглобів

На хвіст

На копито

На голову

66

На рани зашиті швами з валиками накладають

(ВІРНА) лігатурну пов'язку по Медведєву

Лігатурну пов'язку по Гирголаву

Крестову пов'язку

Пращеподібну пов'язку

67

На рани закриті вузлуватими швами накладають

Лігатурну пов'язку по Медведєву

(ВІРНА) лігатурну пов'язку по Гирголаву

Клейову пов'язку

Пращоподібну пов'язку

68

Клейові пов'язки накладають

На кінцівки

(ВІРНА) в ділянках стегон, тулуба, голови

На хвіст

На шию та голову

69

Для накладання клейової пов'язки з колодієм необхідно

Знежирити шерсть

(ВІРНА) збрити шерсть та знежирити шкіру

Місце накладання попередньо не обробляють

Накласти бинтову пов'язку

70

Імобілізуючі пов'язки бувають

Гіпсові та бинтові

Гіпсові та парафінові

(ВІРНА) гіпсові, парафінові, шинні та клейові

Пращовидні, шинні та гіпсові

71

У випадку перелому за допомогою шини фіксують

(ВІРНА) вище та нижче розташовані суглоби

Вище розташований суглоб

Нижче розташований суглоб

Фіксують тільки місце перелому

72

Стулчату гіпсову пов'язку застосовують у випадках

Відкритих переломів

(ВІРНА) при наявності запальних процесів

Переломів у великих тварин

Переломів у дрібних тварин

73

Декстринова пов'язка це

(ВІРНА) іммобілізуюча пов'язка

Бинтова пов'язка

Гіпсова пов'язка

Циркулярна пов'язка

74

Для накладання казеїнової пов'язки необхідно

Видалити шерсть

Знежирити шкіру

Видалити шерсть і знежирити шкіру

(ВІРНА) Поверхню шкіри попередньо не готують

75

Який термін може утримуватися клейова пов'язка

До 3-4 днів

До 7-8 днів

(ВІРНА) до 10-15 днів

До 20 днів

76

В якому випадку використовують тривалу іммобілізацію за допомогою шинної пов'язки

(ВІРНА) при умові доброї підгонки шини

У дрібних тварин

При відсутності набряку тканин

При відсутності зміщення кісткових уламків

77

Що є найкращим підкладковим матеріалом

(ВІРНА) сіра вата

Знежирена вата

Клоччя

Бинт

78

В якому випадку показано використання безпідкладкової гіпсової пов'язки

(ВІРНА) при відкритому переломі

При закритому переломі

При ушибі суглоба

При розтяжінні зв'язок

79

Яка з імобілізуючих пов'язок рекомендується для накуладання на суглоби

(ВІРНА) мостовидна

Глуха

Вікончата

З готових гіплових лонгетів

80

Декстринова пов'язка накладається

(ВІРНА) У дрібних тварин

У великих тварин

При наявності ран на поверхні шкіри

Для попередження набряку тканин

81

Для проведення лікування рани після накладання гіпсової пов'язки останню виконують

Глухою безпідкладковою

(ВІРНА) вікончатою

Стулчатою

З готових гіпсових лангетів

82

На який день найбільш вірогідний розвиток гнійного запалення наглухо закритої рани:

1-2

(ВІРНА) 3-4

5-6

Після зняття швів

83

Для виконання шва з валиками використовують шов:

Вузловатий з одинарної нитки

(ВІРНА) вузловатий з подвоєної нитки

Петлеподібний шов

Кисетний шов

84

В якому випадку не рекомендується накладати безперервний шов:

При натяжінні країв рани

На серозні покриви

При довгих ранах

(ВІРНА) на шкіру

85

Для профілактики кровотечі ВРХ переливають сумісну кров в об'ємі

500-1000 мл

(ВІРНА) 1000-1500 мл

2000-2500 мл

300-500 мл

86

Для профілактики кровотечі коням переливають сумісну кров в об'ємі

(ВІРНА) 500-1000 мл

1000-1500 мл

2000-2500 мл

300-500 мл

87

Для профілактики кровотечі вівцям та свиням переливають сумісну кров в об'ємі

20-50 мл

100-150 мл

(ВІРНА) 200-300 мл

400-500 мл

88

Для профілактики кровотечі переливання сумісної крові проводять

Безпосередньо перед операцією

(ВІРНА) за 30-60 хв до операції

За 2-3 години до операції

За добу до операції

89

Який із кровоупинних засобів протипоказаний при легневих кровотечах

(ВІРНА) адреналін

Кальцію хлорид

Кислота амінокапронова

Вікасол

90

В яких місцях на кінцівках накладають кровоупинних джгут

(ВІРНА) де судини оточені м'язами

Де судини не оточені м'язами

Вище суглобів

На дистальних відділках кінцівок

91

Чим рекомендують просочувати тампони при виконанні тампонади для зупинки кровотечі з

Забруднених ран і при їх інфікуванні

(ВІРНА) Скипидаром

1-2% розчином мідного купоросу

Розчином адреналіну 1:2000

10% розчином антипірину

92

Який з розчинів не використовують для виготовлення вологої відсмоктуючої пов'язки

5-10% розчин цукру

20% маґнію сульфату

5-10% розчин натрію хлориду

(ВІРНА) 10% розчин кальцію хлориду

93

Товщина утримуючого шару сухої всмоктуючої пов'язки повинна не перевищувати

0,5 см

(ВІРНА) 1 см

1,5 см

3-4 турів марлі

94

Тиснучу пов'язку накладають не більш, ніж на:

0,5-1 год

1-2 години

(ВІРНА) 1 добу

0,5 доби

95

Перший поверх оклюзійної пов'язки роблять

(ВІРНА) просоченими мазями чи емульсіями

Просоченими гіпертонічними розчинами солей

З сухої марлі

просоченим антисептичною рідиною

96

У зігрівальному компресі 1-й шар не змочують

(ВІРНА) 1% розчином оцту

Водою кімнатної температури

40-50% розчином спирту

5% розчином соди

97

Через скільки змінюють зігрівальний компрес

(ВІРНА) 4-6 год

2-3 год

0,5-1 год

0,5-1 добу

98

Який інтервал поміж накладанням зігрівальних компресів

0,5 год

1 год

(ВІРНА) 2 годин

4-6 год

99

При змінно-теплому укутуванні внутрішній шар змочують

(ВІРНА) льодяною водою

Водою кімнатної температури

Гарячою водою

Не змочують

100

Шов Шмідена накладають, прошиваючи:

Серозну оболонку

Серозну і м'язову оболонки

Слизову оболонку

(BIPHA) всю товщу органу