

Тесты № 19-23 по Растениеводству на экзамен

Тест 19

1. Оптимальная фаза уборки озимой пшеницы при прямом комбайнировании

- А) середина восковой спелости при влажности зерна 30-35 %
- Б) конец восковой спелости при влажности зерна 20-25 %
- В) полная стоимость при влажности зерна < 16%
- Г) полная спелость при влажности зерна менее 10%

2. Типы соцветия у кукурузы

- А) метелка
- Б) колос
- В) початок
- Г) метелка и початок

3. Оптимальная глубина заделка семян подсолнечника

- а) 3-4см
- б) 5-6см
- в) 7-8см
- г) 9-10см

4. Отличия по колосу твердой пшеницы

- А) колос рыхлый, остистый или безостый, лицевая сторона шире боковой, ости короткие, расходящиеся

Б) колос плотный, лицевая сторона уже боковой остистый, ости длинные параллельные

В) колос рыхлый, остистый, ости длинные, параллельные

5. Оптимальная норма высева сои (среднеспелые Гибриды)

а) 500 тыс./га

б) 700 тыс./га

в) 900 тыс./га

6. Уборка на маслосемена льна масличного

А) полное созревание (коробочки «гремят») – прямое комбайнирование

Б) стебель желтый, листья коричневые, коробочки «гремят» – прямые комбайнирование

В) раздельная уборка

Г) скашивание всей массы с последующим стационарным обмолотом

7. Основная обработка почвы под тритикале после уборки непаровых предшественников

А) глубокая вспашка на глубину 28-30см

Б) вспашка на глубину 22-2 см

В) поверхностные обработки на глубину 8-10см

Г) лущение стерни на глубину 5-6см

8. Оптимальные сроки сева эспарцета на суходоле

а) «январские» или «февральские» окна

б) II-III декада марта

в) I-II декада апреля

г) I-II декада мая

9. Предшественники для гороха на зерно

А) колосовые на зерно

Б) люцерна

В) соя

Г) нут

10. Наиболее экономичный способ уборки озимой пшеницы

А) раздельная уборка в фазу полной спелости

Б) обмолот скошенной массы на стационаре

В) прямое комбинирование при влажности зерна < 16 %

Тест 20

1. Какую группу пестицидов используют в посевах озимой пшеницы против вредителей?

А) гербициды

Б) фунгициды

В) инсектициды

Г) десиканты

2. Оптимальные календарные сроки сева озимого ячменя в Крыму

а) I декада сентября

б) II декада сентября

в) I-2 декада октября

г) 3 декада октября

3. Оптимальная глубина заделки семян сои

- а) 1-2см
- б) 2-3см
- в) 4-5см
- г) 6-8см

4. Отличительные признаки мягкой пшеницы по колосу

- А) колос рыхлый, лицевая сторона шире боковой
- Б) колос рыхлый, лицевая сторона уже боковой
- В) колос плотный, лицевая сторона шире боковой
- Г) колос плотный, лицевая сторона уже боковой

5. Тип плода у люцерны посевной

- А) боб серповидный
- Б) боб спирально завитой
- В) стручок
- Г) коробочка

6. Способ сева льна масличного

- А) узкорядный
- Б) перекрестный
- В) обычный рядковый
- Г) широкорядный

7. Основная обработка почвы под яровой ячмень

- а) вспашка на глубину 20-22см
- б) вспашка на глубину 28-30см

в) дискование в два следа на глубину 10-12см

г) лущение на глубину 6-8см

8. Оптимальная норма высева риса

А) 5-6 млн./га

Б) 7-9 млн./га

В) 10-12 млн./га

Г) 13 млн./га

9. Предшественники для сои при орошении

А) колосовые на зерно

Б) люцерна

В) горох

10. Наиболее экономичный способ уборки озимого ячменя

А) раздельная, с предварительным скашиванием в валки

Б) скашивание всей массы и отвоз ее для обмолот на стационаре

В) прямое комбайнирование при влажности зерна < 16%

Г) прямое комбайнирование при влажности зерна 20-25 %

Тест 21

1. Перечислите зерновые хлеба I группы

а) пшеница, рожь, овес, ячмень, просо

б) просо, сорго, рис, овес

в) пшеница, рожь, овес, ячмень, тритикале

г) пшеница, рожь, рис, ячмень

2. Назовите наиболее распространенный способ сева озимой пшеницы

- А) широкорядный с междурядьями 45см
- Б) широкорядный с междурядьями 70см
- В) обычный рядковый с междурядьями 15см
- Г) обычный рядковый с междурядьями 30см

3. Оптимальная густота стояния среднеспелых гибридов кукурузы на зерно на поливе

- А) 50 тыс./га
- Б) 70 тыс./га
- В) 90 тыс./га
- Г) 110 тыс./га

4. Тип листьев у сои

- А) перистые
- Б) пальчатые
- В) тройчатые
- Г) линейные

5. Уборка подсолнечника на маслосемена

- а) прямое комбинированием при побурении 90% корзинок
- б) раздельная уборка
- в) скашивание и отвоз всей массы для обмолота на стационаре

6. Оптимальный летне-осенний срок сева люцерны при орошении

- а) III декада июля

б) III декада августа – I декада сентября

в) III декада сентября

г) I декада октября

7. Лучшие предшественники под озимую пшеницу при орошении

А) люцерна

Б) соя

В) люцерна и соя

Г) колосовые на зерно

8. Предшественники для подсолнечника на суходоле

А) колосовые на зерно

Б) суданская трава

В) подсолнечник по подсолнечнику

г) многолетние травы

9. Уборка бобово-злаковых смесей на корм

А) в фазу колошения или выметывания злакового компонента

Б) в фазу цветения бобового компонента

В) в фазу восковой спелости зерна злакового компонента

Г) в фазу налива семени бобового компонента

10. Основная обработка почвы под горох после уборки колосовых на зерно

А) дискование на глубину 6-8см

Б) поверхностные обработки на глубину 10-12см

В) зяблевая вспашка на глубину 20-22см

Г) весенняя вспашка на глубину 20-22см