

Тесты требования содержанию ответами

Гигиенические к пастбищному животных с

Тесты с ответами на тему: «Гигиенические требования к пастбищному содержанию животных»

1. Для каких животных применяется пастбищное содержание:

1. поросят-сосунов
2. крупный рогатый скот +
3. кроликов
4. подсосных свиноматок

2. При внесении больших доз азотных удобрений трава бывает токсичной из-за накопления в ней:

1. тяжелых металлов
2. радионуклидов
3. нитратов и нитритов +
4. пестицидов

3. В зависимости от условий использования пастбища делятся на:

1. сезонные +
2. круглогодовые
3. осенние

4. весенние

4. Какие травы произрастают на искусственных пастбищах:

1. дикорастущие

2. однолетние

3. многолетние +

4. ядовитые растения

5. Какие пастбища пригодны для крупного рогатого скота:

1. с высоким травостоем +

2. низким

3. болотистое

4. кустарниковое

6. Использование болотистых пастбищ может вызывать заболевание животных:

остеомалацию +

желудочно-кишечные

болезни вымени

болезни кожи

7. На сырых пастбищах животные страдают:

от недоедания

переедания

от насекомых +

недостатка протеина

8. Для овец и коз необходимы следующие виды пастбищ:

сухие +

увлажненные

лесные и кустарниковые

клеверные

9. Сорные растения произрастают:

на культурных пастбищах

на естественных +

кустарниковых

злаковых

10. Лучшими пастбищами для свиней являются:

естественные +

культурные

кустарниковые

высокотравостойные

11. Лучшими пастбищами для лошадей являются:

сухие +

болотистые

кустарниковые

низкие, сырые

12. Самые близкие участки для пастбища отводятся:

взрослым животным

лошадям

глубокостельным, супоросным +

овцам

13. Ранней весной, после схода талых вод, участки для пастбища обследуют:

ветврач

главный зоотехник

бригадир

комиссия из вышеперечисленных +

14. Для крупного рогатого скота используют пастбище преимущественно имеющее травостой из:

бобово-злаковых растений +

лютиковых

крестоцветных

пасленовых

15. При наличии старых скотомогильников на территории пастбищ их необходимо:

перепахать

огородить +

обжечь огнем

засыпать песком

16. Как выпасают слабых и больных животных:

выделяют в отдельный гурт +

выпасают вместе со здоровыми

не выпасают совсем

выпасают на дальнем пастбище

17.Как часто производится ветеринарный осмотр стада на пастбище:

один раз за период выпаса

один раз в месяц

регулярно +

не осматривают

18.Минимальное количество загонов для стада на пастбище должно быть:

8 – 10 +

1 – 2

1

20 – 30

19.Каково оптимальная величина гуртов на пастбище для крупного рогатого скота:

100 – 150 голов +

10 – 20

30 – 50

200 – 300

20.При оборудовании пастбища устанавливают столбы и натягивают:

веревку

оцинкованную проволоку +

деревянные жерди

металлический трос

21. При какой высоте травостоя можно выпасать животных, см:

8 – 10 +

1 – 2

15 – 20

3 – 4

22. На каком принципе основан способ применения “электропастуха”:

на рефлексе молокоотдачи

условном рефлексе +

запугивании животного

привычке

23. Продолжительность пастьбы крупного рогатого скота в сутки должна быть не менее (часов):

10 – 12 +

2 – 3

5 – 8

4 – 6

24. Продолжительность пастьбы свиней в сутки должна быть (часов):

12 – 16

24

18 – 20

1,5 – 2 +

25. Вред от нападения насекомых снижает молочную продуктивность коров (%):

50

10

20 – 35 +

5 – 7

26. Вред от нападения насекомых снижает приросты крупного рогатого скота (%):

30 – 40

15 – 20 +

3 – 5

70 – 80

27. Для защиты животных от гнуса применяют:

ДДТ

Хлорофос +

Раствор йода

Дистиллированную воду

28. Убой животных на мясо после обработки хлорофосом разрешается через (сутки):

60

15 +

через 1

сразу

29.Что понимается под стойлово-лагерным содержанием животных:

круглогодовое содержание в помещении

сезонное содержание в лагере +

круглогодовое содержание в лагере

ежедневное содержание в лагере

30.Для чего устраивают навесы в лагерях для животных:

для защиты от снега

для защиты от солнечных лучей и дождя +

от мух

от воздействия ветра

31.Для чего вводят в травостой пастбища бобовые растения:

для улучшения жирового обмена

для белкового баланса +

для обеспечения углеводами

для лучшего пищеварения

32.За какое время до выпаса на пастбище должна начинаться подготовка животных:

за полгода

за 3 месяца

1 – 1,5 месяца +

ежедневно

33. При содержании на пастбище животные получают воду:

из ведра

централизованно

подвозится цистерной +

из дождевых источников

34. Для увеличения продуктивности пастбищ необходимо внести в почву:

навоз

азотные удобрения +

доломит

пестициды

35. Первый день выпаса животных на пастбище должен ограничиваться (часы):

1 +

8

24

12

36. Заболевание вызванное недостатком кобальта в траве растений называется:

рахит

гиповитаминоз

акобальтоз +

сухотка

37.Навесы для телят с закрытыми стенами устраивают:

до 6 мес. возраста +

старше года

6-8 мес. возраста

12-24 мес. возраста

38.Лошадей пасут:

по 1 голове в отдельности

табунами +

по 2-5 голов

кобыла с приплодом

39.После стравливания пастбища, что необходимо с ним проделать:

продезинфицировать

разровнять и разбросать фекалии +

внести доломитовую муку

обработать хлорофосом

40.При пастбищной системе содержания поить животных необходимо:

1 раз в сутки

не менее 3 раз в сутки +

один раз в два дня

достаточно воды из травы