

Тести по акушерство с ответами

1

Що таке лактація:

Процес виділення молока за певний строк

(ВІРНА) складається з процесів молокоутворення і молоковіддачі

Це процес утворення молока

Це процес молоковіддачі

2

Процес молокоутворення стимулюється:

(ВІРНА) пролактином

Лютеостероном

Фолікуліном

Окситоцином

3

Молочна залоза – це похідний орган:

(ВІРНА) шкіри

Жирової тканини

М'язової тканини

Крові

4

Процес молоковідділення стимулюється:

Лютеостероном

Пролактином

(ВІРНА) окситоцином

Фолікуліном

5

Залозистий апарат альвеол вкритий:

Скелетними м'язами

(ВІРНА) міоепітелієм

Сполучною тканиною

Жовтою фасцією

6

Самовільне відділення молока в результаті ослаблення дійкового сфінктеру

Називається:

Агалактія

Гіпогалактія

Індурація

(ВІРНА) лакторея

7

Затримка відділення молока в наслідок різноманітної патології сфінктера

Має назву:

Лакторея

Індурація

(ВІРНА) тугодійкість

Мастит

8

Штучно набута агалактія виникає в наслідок:

Неповноцінного годування

Розладу обміну речовин

(ВІРНА) несвоєчасного запуску

Травми вим"я

9

Аліментарна агалактія виникає в наслідок:

Патології молочної залози

Надмірної експлуатації

(ВІРНА) розладів у повноцінній і якісній годівлі

В сухостійному періоді

10

Симптоматична агалактія виникає в наслідок:

Недодоявання

Надмірної експлуатації

Несвоєчасного запуску

(ВІРНА) захворювань молочної залози

11

Вроджена агалактія виникає в наслідок:

Аліментарних факторів

Захворювань

(ВІРНА) недостатньої селекційно-племінної справи

Раннього парування самок

12

Поява у молоці пластівців та згустків казеїну на початку доїння, після чого

Відділяється нормальне молоко, свідчить про наявність:

Фібринозного маститу

Катару альвеол

(ВІРНА) катару цистерн і молочних ходів

Гнійно-катарального маститу

13

Експлуатаційна агалактія є наслідком:

Захворювань

Поганої годівлі

(ВІРНА) надмірної експлуатації

Порушень умов мікроклімату

14

Виділення молока сірувато-білого кольору з домішками
пластівців і гною,

Іноді крові, свідчить про наявність:

Серозного маститу

Фібринозного маститу

Катару альвеол

(ВІРНА) гнійно-катарального маститу

15

Виділення з молоком пластівців і кульок фібриногену
підтверджує:

Серозний мастит

(ВІРНА) фібринозний мастит

Катаральний мастит

Гнійний мастит

16

Розростання інтерстиціальної сполучної тканини вим"я з
одночасною атрофією

Паренхіми спостерігається при:

Туберкульозі вим"я

Актиномікозі вим"я

Гангрені вим"я

(ВІРНА) індурації вим"я

17

Застосування масажу вим"я у напрямку знизу вгору
рекомендується при

Маститі:

Фібринозному

Катаральному

Геморагічному

(ВІРНА) серозному

18

Масаж згори вниз проводять при маститі:

Серозному

Фібринозному

Геморагічному

(ВІРНА) катаральному

19

Проведення масажу забороняється при:

Серозному маститі

(ВІРНА) гнійно-катаральному та фібринозному маститі

Катару альвеол

Катару цистерн і молочних ходів

20

Яка ознака не являється вадю молока:

Зміна запаху

Зміна консистенції

Зміна смаку

(ВІРНА) зміна складу

21

Показання до оперативного втручання в ділянці молочної залози:

Кормові екзантеми

Серозний мастит

(ВІРНА) фістули (свищі) і звуження порожнини молочної цистерни,

(ВІРНА) зарощення або відсутність дійкового каналу

Гнійно-катаральний мастит

22

Подальше господарське використання корови після ампутації вим'я:

Залишають у стаді

(ВІРНА) відгодовують і здають на забій

Використовують як донора при трансплантації ембріонів

Використовують як реципієнта при трансплантації ембріонів

23

Основні причини поранення і ушибу вим'я у самок:

Виснаження і різке схуднення

Ожиріння

(ВІРНА) травми різного походження

Порушення мікроклімату

24

Основні причини опіків вим"я:

Травми

Біологічні фактори

(ВІРНА) дія високотемпературного фактора та попадання кислоти і лугів

Дія низьких температур

25

Основні причини обмороження вим"я:

(ВІРНА) дія низькотемпературного фактора

Попадання сильних дезінфектантів

Дія висмоких температур

Укуси отруйних тварин

26

Основні причини "затримки" молока при відсутності морфологічних змін:

Погана годівля

Недодоявання молока

(ВІРНА) рефлекторне гальмування “рефлексу” молоковіддачі

Недостатня кількість пролактину

27

Основні причини тріщин діжок:

Механічні травми сторонніми предметами

Дія хімічних факторів

(ВІРНА) обвітрювання і сухість шкіри

Дія біологічних факторів

28

Що складає основу кормових екзантем:

Обвітрювання

(ВІРНА) згодовування кормів з алергодіючими властивостями

Опіки і обморожування

Механічні пошкодження

29

Мета знеболювання вим’я:

Для доїння

Для проведення масажу

(ВІРНА) для оперативного втручання

Для огляду

30

Мета внутрішньоцистернального введення лікарських речовин:

Підвищення якості молока

Підвищення регідності вим"я

(ВІРНА) з лікувальною і профілактичною метою

Підвищення швидкості молокоутворення

31

Мета катетеризації вим"я:

(ВІРНА) введення лікарських речовині повітря, прискорення
здоювання,

(ВІРНА) розширення дійкового каналу

Ведення окситоцину

Усунення молочних пробок

Для огляду слизової оболонки цистерни вимені

32

Мета проведення масажу вимені при маститах:

Прискорення процесу молокоутворення

(ВІРНА) прискорення дії захисних механізмів у розв'язання запального

(ВІРНА) процесу

Збільшення молочної продуктивності

Підвищити температуру у вимені

33

Мета проведення масажу вимені у нетелів і первісток:

Терапія мастита

Профілактика індурації

(ВІРНА) прискорення росту паренхіми вим'я, збільшення молочної

(ВІРНА) продуктивності, привчання до доїння, профілактика маститу

Підвищити температуру у вимені

34

Мета проведення холодних компресів:

(ВІРНА) протизапальна дія

Антимікробна дія

Підвищення жирномолочності

Підвищити резистентність методом закалювання

35

Мета проведення зігріваючих компресів:

Підвищення молочної продуктивності

(ВІРНА) для прискорення розвитку запального процесу

Стимуляція росту паренхіми вим"я

Не можна цього робити ні в якому разі

36

Зігріваючі компреси застосовують у вигляді:

Мазей

Лініментів

(ВІРНА) водяних і спиртових компресів

Порошків

37

Для компресів використовують спирти:

Ізоаміловий

(ВІРНА) етиловий, камфорний, іхтиоловий

Метиловий

Етакридиновий

38

Для лікування самок при різних формах маститів застосовують:

Перцовий пластр

Подразнючі мазі

(ВІРНА) парафіно – і озокерітотерапію

Формалін

39

Світлотерапія включає використання:

Ультразвуку

(ВІРНА) інфрачервоного опромінення

Ультрафіолетового опромінення

Радіактивного випромінювання та застосування лазеру

40

Ультрафіолетове опромінення в ділянці молочної залози проводиться з

Використанням ламп:

Денного освітлення

Солюкс і Інфраруж

(ВІРНА) з ртутно-кварцевими горілками

Бактерицидних

41

Мета застосування ультразвукової терапії:

(ВІРНА) зниження ацидозу, покращення кровозабезпечення молочної

(ВІРНА) залози, посилення обміну речовин, регенерація тканин, посилення

(ВІРНА) фагоцитозу і знеболення органу

Підвищення жирномолочності

Підвищення продуктивності

Підвищення швидкості коливання жирових молекул

42

Принцип лікування свіжих поверхневих ран у ділянці молочної залози:

Не лікують

(ВІРНА) після відповідного туалету і видалення рваного краю накладають

(ВІРНА) шви

Промивають перекисом водню

Щоден із варіантів не вірний

43

Принцип надання допомоги при ушибі вим"я:

Не надається

Обробка настойкою йоду

(ВІРНА) спокій тварині, в перші дві доби холодні компреси і втирання

(ВІРНА) однієї з подразнюючих мазей

В/в розчин Рінгера-Локка

44

Принцип надання допомоги при опіках вим"я:

Сухі присипки антибіотиків

Обливання холодною водою

(ВІРНА) спокій, обробка опікових ділянок борним вазеліном, риб"ячим

(ВІРНА) жиром або емульсіями стрептоциду чи синтоміцину

Сухий холод

45

Принцип надання допомоги при обморожування вим"я:

Орошення ділянок перекисом водню

(ВІРНА) обережне очищення ділянок від бруду, змазування ділянок свіжим

(ВІРНА) топленим смальцем або гусячим жиром, а тріщини і ерозії змазують

(ВІРНА) йод-гліцеріном і присипають антибіотиком

Накладання гарячих компресів

Накладання холодних компресів для припинення руйнування тканин

46

Принцип надання допомоги при кормових екзантемах:

Інтенсивне напування і годівля

Інтенсивний масаж

(ВІРНА) виключення з раціону алергенів, шкіру обережно вичищають, а

(ВІРНА) ділянки з ознаками підмокання обробляють 2% спиртовим розчином

(ВІРНА) питної соди або камфорним спиртом і приподрюють таніном,

(ВІРНА) тальком, ксероформом чи крахмалом

Активний моціон

47

Принцип надання допомоги при тріщинах діжок:

Допомога не надається

(ВІРНА) обмивання діжок до і після доїння теплою водою і обробка їх 5%

(ВІРНА) борним вазеліном або антисептичною емульсією. При сильних

(ВІРНА) болях – мазь з анастетиками, а ранки лікують за правилами

(ВІРНА) хірургії

Використовують подразнюючі мазі

Варіанти 2 та 3

48

Принцип надання допомоги при лактореї:

Накладання лігатури на дійки

Введення в дійковий канал на 2-3 години бужів

(ВІРНА) після кожної дійки протягом 15 хвилин масаж верхівки і закриття

(ВІРНА) дійкового каналу колодієм

Допомога безперспективна

49

Принцип надання допомоги при “затримці молока”:

Допомога не надається

(ВІРНА) обережне здоювання, накачування повітря в гумову камеру,

(ВІРНА) введену у піхву, 2-3 рази з інтервалом 24-48 годин

Гарячі компреси

Холодні компреси

50

Принцип надання допомоги при звужуванні дійкового каналу:

Застосування бужів 0. 0.0сєтрова

Оперативне видалення тканин, що закривають дїйковий канал за

Допомогою катетера Гуга

(ВІРНА) можна застосовувати обидва названі методи

Все вище перераховане