

Тесты по клещам

ВАРИАНТ №1

1. К отряду Parasitsformes относят семейства:

A) Gamasoidea Ixoidea

Б) Oribatei

В) Sarcoptoidea

2. Щитки у самцов покрывают :

A) переднюю поверхность спины

Б) всю спину

В) заднюю часть спины

3. У паразитиформных клещей глаза расположены :

A) на уровне 2 пары конечностей

Б) на уровне 3 пары конечностей

В) на уровне 4 пары конечностей

4. Что такое перитрема:

A) пластинки вокруг дыхальцев

Б) анальная бороздка

В) часть ротового аппарата

5. Яйца паразитиформных клещей:

A) до 0,5мм, овальные, покрыты твердой оболочкой, незрелые

Б) до 0,5мм, овальные, покрыты твердой оболочкой, зрелые

В) до 0,5мм, овальные, без оболочки, незрелые

6. Личинка клещей пьет кровь:

- А) 3-7 дней
- Б) 3-10 дней
- В) 8-10 дней

7. Двуххозяинные клещи:

- А) все стадии проходят на одном животном
- Б) личинка и нимфа на одном животном, а имаго на другом
- В) в процессе биологического цикла меняют 3 хозяев

8. Клещи имеют длинный хоботок с 4гранной основой, глаз нет, анальная борозда спереди. Вентральная сторона покрыта щитками. Клещ темно-коричневый, у самок кутикула серая:

- А) иксоды
- Б) стеклоглаз
- В) шкурорез

9. Наиболее распространенный клещ рода *Ixodes* :

- А) *Ixodes ricinus*
- Б) *Ixodes plumbeum*
- В) *Ixodes detritum*

10. Окраска клещей пятнистая, с серебристым оттенком дорсального щитка, хоботок длинный с 4гранной основой, есть глаза, анальная борозда сзади.

- А) иксоды
- Б) шкурорез
- В) кроволуб

11. Маленькие клещи, хоботок короткий с 4гранной основой, глаз нет, анальная борозда сзади, у самцов нет вентральных щитков.

A) Ixodes

Б) Dermacentor

В) Haemaphysalis

12. Клещи красно-коричневого цвета, хоботок 6гранный, есть глаза, 2 пары вентральных щитков у самцов:

A) Boophilus

Б) Dermacentor

В) Rhipicephalus

13. К клещам рода Rhipictphalus относят :

A) Rhipictphalus turanicus

Б) Rhipictphalus calcaranus

В) Rhipictphalus pictus

14. Расход акарицидов для опрыскивания КРС:

A) 2-3 л/гол

Б) 1.5-2 л/гол

В) 0.5 л/гол

15. Концентрация неоцидола для обработки животных:

A) 0,1%

Б) 0,2%

В) 0,5%

16. Концентрация дикрезила для обработки животных:

А) 0,1%

Б) 0,5%

В) 2%

17. Клещ яйцеобразной формы, желто-серый, 10-13мм. Тело сплющено, по краю расположен рант, хоботок расположен с вентральной стороны. Половое отверстие на уровне 1 пары конечностей:

А) Argasidea

Б) Ixodes

В) Gamasoidea

18. Срок жизни персидского клеща:

А) 1 год

Б) 10 лет

В) 15 лет

19. Обработку против персидских клещей проводят :

А) одноразово

Б) дважды с интервалом в 1 месяц

В) дважды с интервалом в 12-15 дней

20. Назовите препараты, применяемые для борьбы с личинками клещей

21. Куриный клещ:

А) однохозяйный

Б) двуххозяйный

В) треххозяинный

22. Деакаризацию против куриного клеща проводят :

А) одноразово

Б) дважды с интервалом в 7 дней

В) дважды с интервалом в 14 дней

23. У возбудителя самки 1,2-1,75мм, коричневого цвета, самцы 0,85-0,8мм, желтого цвета, у самок хорошо развит ротовой аппарат, у самцов его нет:

А) варроотоз

Б) красный куриный клещ

В) персидский клещ

24. Средняя степень жизнеспособности пчелиной семьи при варроотозе:

А) 10 клещей на 100 личинок

Б) 20 клещей на 100 личинок

В) 30 клещей на 100 личинок

ВАРИАНТ №2 Тест задания

1. К отряду Gamasoidea относят семейства:

А) Dermanyssidae

Б) Argasidae

В) Psoroptidae

2. Щитки у самок покрывают :

А) переднюю поверхность спины

Б) всю спину

В) заднюю часть спины

3. Анальное отверстие у клещей расположено:

А) на уровне 2 пары конечностей

Б) на уровне 3 пары конечностей

В) на уровне 4 пары конечностей

4. Стигмы расположены:

А) позади 2 пары конечностей

Б) позади 3 пары конечностей

В) позади 4 пары конечностей

5. Личинка клещей имеет:

А) 3 пары ног, нет дыхальцев и анального отверстия

Б) 3 пары ног, есть дыхальца и нет анального отверстия

В) 3 пары ног, есть дыхальца и есть анальное отверстие

6. Нимфа клещей пьет кровь:

А) 3-7 дней

Б) 3-10 дней

В) 8-10 дней

7. Однохозяинные клещи:

А) все стадии проходят на одном животном

Б) личинка и нимфа на одном животном, а имаго на другом

В) в процессе биологического цикла меняют 3 хозяев

8. Клещи темного цвета, имеют длинный хоботок с 4гранной основой, хорошо видны глаза, анальная борозда сзади. У самцов 3 пары вентральных щитков:

A) Ixodes

Б) Hyalomma

В) Dermacentor

9. Клещи темного цвета, имеют длинный хоботок с 4гранной основой, хорошо видны глаза, анальная борозда сзади. У самцов 3 пары вентральных щитков:

A) иксоды

Б) стеклоглаз

В) шкурорез

10. Окраска клещей пятнистая, с серебристым оттенком дорсального щитка, хоботок длинный с 4гранной основой, есть глаза, анальная борозда сзади.

A) Ixodes

Б) Dermacentor

В) Haemaphysalis

11. Маленькие клещи, хоботок короткий с 4гранной основой, глаз нет, анальная борозда сзади, у самцов нет вентральных щитков.

A) иксоды

Б) шкурорез

В) кроволуб

12. К клещам рода Haemaphysalis относят :

- A) *Haemophysalis pictum*
- Б) *Haemophysalis otophila*
- В) *Haemophysalis marginatus*

13. К клещам рода *Rhipictphalus* относят :

- A) *Rhipictphalus bursa*
- Б) *Rhipictphalus calcaranus*
- В) *Rhipictphalus pictus*

14. Клещи с коротким хоботком с 6-гранной основой, есть глаза, 2 пары вентральных щитков у самцов, у самок кутикула светло-коричневая:

- A) веероголов
- Б) быколюб
- В) иксодес

15. Расход акарицидов для опрыскивания помещений:

- A) 2-3 л/гол
- Б) 1.5-2 л/гол
- В) 2 л/м

16. Концентрация дитразина для обработки животных:

- A) 0,1%
- Б) 0,2%
- В) 0,5%

17. Персидский клещ паразитирует на :

- A) птице

Б) КРС

В) собаках

18. Нормы использования акарицидов при борьбе с персидским клещом:

А) 50-100 мл/м

Б) 1000-2000мл/м

В) 200-300мл/м

19. Назовите препараты, применяемые для борьбы с персидским клещом:

20. К гамазоидным клещам относят :

А) *Dermanyssus gallinae*

Б) *Argas persicus*

В) *Boophilus calcaranus*

21. За какое время развивается одна генерация куриного клеща:

А) 7 дней

Б) 14 дней

В) 21 день

22. Место обитания куриного клеща:

А) щели и трещины в стенах

Б) на теле птицы

В) на теле млекопитающих

23. Возбудитель варрооза пчел :

А) *Varroa jacobsoni*

Б) *Varroa persicus*

В) *Varroa calcaranus*

24. Слабая степень жизнеспособности пчелиной семьи при варроотозе:

А) 10 клещей на 100 личинок

Б) 20 клещей на 100 личинок

В) 30 клещей на 100 личинок

ВАРИАНТ №3

1. К отряду Ixoidae относят семейства:

А) *Dermanyssidae*

Б) *Argasidae*

В) *Psoroptidae*

2. У клещей тело состоит из:

А) головы, груди и брюшко

Б) головогруды и брюшка

В) не разделено на отделы

3. Половое отверстие у клещей расположено:

А) на уровне 2 пары конечностей

Б) на уровне 3 пары конечностей

В) на уровне 4 пары конечностей

4. Стилгами у клещей называют:

А) дыхальца

Б) анальное отверстие

В) половое отверстие

5. Что такое гипостома:

А) пластинки вокруг дыхальцев

Б) анальная бороздка

В) часть ротового аппарата

6. Нимфа клещей имеет:

А) 4 пары ног, нет полового отверстия

Б) 3 пары ног, нет полового отверстия и дыхальцев

В) 4 пары ног, есть половое отверстие

7. Имаго клещей пьет кровь:

А) 3-7 дней

Б) 3-10 дней

В) 8-10 дней

8. Однохозяинные клещи:

А) все стадии проходят на одном животном

Б) личинка и нимфа на одном животном, а имаго на другом

В) в процессе биологического цикла меняют 3 хозяев

9. Клещи имеют длинный хоботок с 4гранной основой, глаз нет, анальная бороздка спереди. Вентральная сторона покрыта щитками. Клещ темно-коричневый, у самок кутикула серая:

А) Ixodes

Б) Hyalomma

В) Dermacentor

10. Наиболее распространенный клещ рода *Hyalomma*:

- A) *Hyalomma ricinus*
- Б) *Hyalomma plumbeum*
- В) *Hyalomma detritum*

11. К клещам рода *Dermacentor* относят :

- A) *Dermacentor pictum marginatus*
- Б) *Dermacentor otophila*
- В) *Dermacentor ricinus*

12. К клещам рода *Haemophysalis* относят :

- A) *Haemophysalis pictum*
- Б) *Haemophysalis punctata*
- В) *Haemophysalis marginatus*

13. Клещи красно-коричневого цвета, хоботок 6-гранный, есть глаза, 2 пары вентральных щитков у самцов:

- A) веероголов
- Б) быколюб
- В) кроволуб

14. К клещам рода *Boophilus* относят :

- A) *Boophilus bursa*
- Б) *Boophilus calcaranus*
- В) *Boophilus pictus*

15. Клещи с коротким хоботком с 6-гранной основой, есть глаза, 2 пары вентральных щитков у самцов, у самок кутикула

светло-коричневая:

A) Rhipicephalus

Б) Boophilus

В) Ixodes

16. Расход акарицидов для обработки МРС:

A) 2-3 л/гол

Б) 1.5-2 л/гол

В) 0.5 л/гол

17. Концентрация цидрина для обработки животных:

A) 0,5%

Б) 1%

В) 2%

18. Помещение против клещей обрабатывают севинном в концентрации:

A) 1%

Б) 2%

В) 3%

19. Персидский клещ относится к роду:

A) Argasidea

Б) Ixodes

В) Gamasoidea

20. Персидский клещ:

A) однохозяинный

Б) двуххозяинный

В) треххозяинный

21. Клещ 0.6-0.7мм., светло-желтого цвета, после кровососания красный, тело удлинено-овальное, ноги длинные, ротовой аппарат колюще сосущего типа, самцы меньше самок:

А) персидский клещ

Б) красный куриный клещ

В) варроотоз

22. Назовите препараты, применяемые для борьбы с куриным клещом:

23. Возбудитель варроотоза пчел относят к семейству:

А) Gamasoidea

Б) Argasidea

В) Ixodes

24. Где больше развивается варроотоз:

А) в трутневом расплоде

Б) в маточном расплоде

В) в расплоде рабочих пчел

25. Сильная степень жизнеспособности пчелиной семьи при варроотозе:

А) 10 клещей на 100 личинок

Б) 20 клещей на 100 личинок

В) 30 клещей на 100 личинок